

Preparacion y limpieza intestinal de Golytely-para examen colonoscopico durante Ia tarde.

Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricación las instrucciones dadas por la farmacia.

Instrucciones para limpiar el colon

El dia antes de su examen puede desayunar como lo hace regularmente. Despues tendni que estar en una dieta de liquidos claros empezando a las 12pm. Liquidos claros consiste en: caldo de polio, caldo de sopas, cafe, tea, sodas, paletas de hielo, etc. Una o dos onzas de leche solo para darle sabor a su cafe. Evite liquidos de color Rojo, Azul y Verde. Tambien evite comer JELL-O. Debe tomar muchos liquidos durante todo el dia. Puede tomar liquidos claros antes de las 8am el dia de su examen.

Laxante/Purgativo/Golytely

El dia antes del examen mezcle Golytely con un gallon de agua destilada y pongalo en el refrigerador. A las 12 de medio dia tomara 2 pastillas de Dulcolax con agua (no necesita receta para estas pastillas) A las 8pm (puede empezar antes si gusta) tome 8 onzas de Golytely cada 10 minutos hasta que consuma medio gallon. Puede tomar toda el agua que usted guste durante este tiempo.

El dia del examen a las 6am continuara tomando 8 onzas de Golytely cada 10 minutos hasta consumir lo que resta. Esta segunda dosis tiene que termimirsela 2 horas antes de su examen.

Medicamentos

1. Favor de dejar de tomar coumadin y hierro 7 dias antes del examen si es posible. Consulte con su doctor familiar para asegurarse de que pueda dejar de tomar coumadin. Nosotros le haremos un amilisis de sangre un dia antes de la colonoscopia para aseguramos de que su sangre no este muy delgada/anti coagulada.
2. Por favor diganos si usted esta tomando algunos de estos medicamentos: Aspirin, Plavix, Bufferin, Motrin, Ibuprofen, Advil, Naprosyn, Aleve, Nuprin y Alka-Seltzer.

Tomese todos sus otros medicamentos como lo hace usualmente el dia del examen con un poco de agua.

Si usted tiene Diabetes:

1. No tome sus pastillas de diabetes el dia de su examen.
2. Si usted toma insulina antes de dormir, solo tome la mitad de su dosis usual.
3. Si toma insulina dos veces al dia, solo tome la mitad de su dosis usual por la mafiana el dia de su colonoscopia.

Fecha del examen: ___ / ___ / _____ Hora del examen: ___ : ___ am/pm Hora de llegada: ___ : ___ am/pm

Por favor haga planes para que alguien lo/la maneje a casa despues del examen. Debido a que el medicamento que se le administrara para sedarlo/a no lo dejara manejar o tomar cualquier responsabilidad por el resto del dia. El examen no se llevara a cabo si viene solo, por autobus, o en taxi. Estara listo/a para ser liberada en aproximadamente 30 minutos despues del examen.

Hay la posibilidad de que su seguro no cubra el examen. Le sugerimos que se ponga en contacto con la compaflia de su seguro para verificar la cobertura. Todos los cargos pendientes seran la responsabilidad del paciente.

Baptist Medical Center
111 Dallas Street
San Antonio, Texas 78205
(210)-297-7000

Christus Santa Rosa Hospital
Alamo Heights at 403 Treeline Park
San Antonio, Texas 78209
(210)-294-8000

Connally Memorial Medical Center
499 10th Street
Floresville, Texas 78114
(830) 393-1300

GAB Endoscopy Center, Ltd
621 Camden Street #102
San Antonio, Texas 78215
(210) 253-3430

Medina Regional Hospital
3100 Avenue E
Hondo, Texas 78861
(830) 426-7700

Metropolitan Methodist Hospital
1310 McCullough
San Antonio, Texas 78212
(210) 757-2200

Mission Trails Baptist Hospital
3333 Research Plaza
San Antonio, Texas 78235
(210) 291-3000

Nix Medial Center
414 Navarro Street
San Antonio, Texas 78205
(210) 271-1800

Nix Alamo Heights
5307 Broadway St Ste 200
San Antonio, Texas 78209
(210) 824-3130

South Texas Regional Medical Center
1905 Highway 97 East
Jourdanton, Texas 78026
(830) 769-3515

Southwest General Hospital
2317 Sw Military Dr
San Antonio, TX 78224
(210) 922-8989