

Preparación intestinal de Suprep Kit

Instrucciones para el examen por la mañana

Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricación las instrucciones dadas por la farmacia.

El día antes del examen tendrá que estar en una dieta de líquidos claros todo el día. Líquidos claros consiste en: caldo de pollo, caldo de sopas, café, té, sodas, paletas de hielo, etc. Una o dos onzas de leche solo para darle sabor a su café. Evite líquidos de color rojo, azul y verde. También evite comer JELL-O. Debe tomar muchos líquidos durante todo el día hasta la cena.

Laxante/Purgativo



1. A las 6pm el día antes del examen prepare el Suprep Bowel Prep Kit. Vacíe un frasco de 6 onzas en el vaso de mezclar.
2. Agregue agua potable fresca hasta la línea del vaso y mezcle.
3. Tómese todo el líquido del vaso.
4. Deberá tomar dos vasos más de 16 onzas de agua durante la hora siguiente.
5. A las 4am el día del examen repita los pasos 1 a 4 indicados anteriormente.

Medicamentos

1. Favor de dejar de tomar cumadin y hierro 7 días antes del examen si es posible. Consulte con su doctor familiar para asegurarse de que pueda dejar de tomar coumadin. Nosotros le haremos un análisis de sangre un día antes de la colonoscopia para asegurarnos de que su sangre no esté muy delgada/anti coagulada.
2. Por favor díganos si usted está tomando algunos de estos medicamentos: Aspirin, Plavix, Bufferin, Motrin, ibuprofen, Advil, Naprosyn, Aleve Nuprin y Alka-Seltzer, Aggrenox o cualquier otro anticoagulante.

Tómese todos sus otros medicamentos como lo hace usualmente el día del examen con un poco de agua.

Si usted tiene diabetes:

1. No tome sus pastillas de diabetes el día de su examen.
2. Si usted toma insulina antes de dormir, solo tome la mitad de su dosis usual.
3. Si toma insulina dos veces al día, solo tome la mitad de su dosis usual por la mañana el día de su colonoscopia.

Fecha del examen: ___ / ___ / _____ Hora del examen: ___ : ___ am/pm Hora de llegada: ___ : ___ am/pm

Por favor haga planes para que alguien lo/la maneje a casa después del examen. Debido a que el medicamento que se le administrará para sedarlo/a no lo dejara manejar o tomar cualquier responsabilidad por el resto del día. El examen no se llevara a cabo si viene solo, por autobus, o en taxi. Estara listo/a para ser liberada en aproximadamente 30 minutos después del examen.

Hay la posibilidad de que su seguro no cubra el examen. Le sugerimos que se ponga en contacto con la compañía de su seguro para verificar la cobertura. Todos los cargos pendientes serán la responsabilidad del paciente.

Baptist Medical Center
111 Dallas Street
San Antonio, Texas 78205
(210)-297-7000

Christus Santa Rosa Hospital
Alamo Heights at 403 Treeline Park
San Antonio, Texas 78209
(210)-294-8000

Connally Memorial Medical Center
499 10th Street
Floresville, Texas 78114
(830) 393-1300

GAB Endoscopy Center, Ltd
621 Camden Street #102
San Antonio, Texas 78215
(210) 253-3430

Medina Regional Hospital
3100 Avenue E
Hondo, Texas 78861
(830) 426-7700

Metropolitan Methodist Hospital
1310 McCullough
San Antonio, Texas 78212
(210) 757-2200

Mission Trails Baptist Hospital
3333 Research Plaza
San Antonio, Texas 78235
(210) 291-3000

Nix Medial Center
414 Navarro Street
San Antonio, Texas 78205
(210) 271-1800

Nix Alamo Heights
5307 Broadway St Ste 200
San Antonio, Texas 78209
(210) 824-3130

South Texas Regional Medical Center
1905 Highway 97 East
Jourdanton, Texas 78026
(830) 769-3515

Southwest General Hospital
2317 Sw Military Dr
San Antonio, TX 78224
(830) 922-8989